



isicom® 100 mg – vhodný na rýchle začatie liečby

- obsahuje levodopu 100 mg + karbidopu 25 mg v pomere 4:1
- prispôsobený na jednoduché a presné dávkovanie;
- postupné nastavovanie v priebehu niekoľko týždňov až k dosiahnutiu individuálnej optimálnej dennej dávky.

isicom® 250 mg – vhodný pre vyššie dávky a dlhodobé používanie

- obsahuje levodopu 250 mg + karbidopu 25 mg v pomere 10:1

Príklad dávkovania isicom® 100 mg:

	1. až 3. deň	1. až 3. deň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň
ráno						
na obed						
poobede						
večer						
	100 mg	150 mg	200 mg	250 mg	300 mg	350 mg

isicom®
easy go

Výhody isicom-u

- ľahko deliteľné tlakom na tabletku oproti podložke;
- tabletky sú rozpustné vo vode;
- sú ideálne na presné vytitrovanie dávky;
- vyznačujú sa dokázanou vynikajúcou biologickou dostupnosťou.



Spôsob podávania

- dennú dávku je vhodné rozdeliť do 3-4 dielčích dávok;
- tabletky treba prehltnúť na konci ľahkého jedla a zapíť pohárom vody.



Doba podávania

- isicom® 100 mg/250 mg sa zvyčajne podáva dlhodobo, až niekoľko rokov.

Prestavenie

- Po prestavení liečby z liekov, ktoré obsahujú inhibitory dekarboxylázy na isicom®, je potrebné liečbu prerušiť najmenej na 12 hodín.
- Dávku isicom-u je potrebné od začiatku liečby nastaviť tak, aby zodpovedala doteraz podávanej dávke levodopy.

